

Point épidémiologique COVID-19 du 16 février 2023 Les indicateurs de suivi de l'épidémie toujours en diminution

Les taux d'incidence et de positivité en diminution dans la majorité des classes d'âge et des régions

En semaine 06 (du 06 au 12 février 2023), les indicateurs virologiques étaient à un niveau faible et continuaient à diminuer sur le territoire national chez les moins de 60 ans tandis qu'une stabilisation des taux d'incidence et de positivité était globalement observée chez les 60 ans et plus¹.

Les nombres de nouvelles hospitalisations et de décès poursuivent leur baisse

En semaine 06, les nouvelles hospitalisations (1 222, -18%) et les décès (116, -32%) poursuivaient leur diminution dans la majorité des régions (données non consolidées). Les recours pour suspicion de COVID-19 tous âges étaient en légère hausse aux urgences (760, +4%) et stables chez SOS Médecins (606, +2%).

Variants : le sous-lignage BA.5 reste majoritaire mais continue sa diminution

Depuis l'émergence d'Omicron fin 2021, une diversification génétique importante et rapide est observée au sein de ce variant et de ses sous-lignages successifs. Cependant, **tous les sous-lignages d'Omicron décrits jusqu'ici gardent des caractéristiques très similaires, et restent donc tous inclus au sein de celui-ci**. En France métropolitaine, BA.5 (tous sous-lignages confondus) restait majoritaire mais continuait à diminuer avec 74% des séquences interprétables de l'enquête Flash S04 du 23/01/2023 (vs 78% pour Flash S03). Parmi les sous-lignages de BA.5, la détection de BQ.1.1 (ses sous-lignages inclus) semblait se stabiliser avec 59% des séquences interprétables de Flash S04-2023 (vs 60% pour Flash S03). En parallèle, on observait une stabilisation des sous-lignages de BA.2 (11% pour Flash S03 et Flash S04-2023) et une augmentation du recombinant XBB (de 9% pour Flash S03 à 14% pour Flash S04-2023). Parmi les sous-lignages du recombinant XBB, XBB.1.5 augmentait le plus rapidement, de 7% pour Flash S03 à 11% pour Flash S04-2023. Ces dynamiques de circulation entre les sous-lignages d'Omicron observées mi-janvier n'ont pour l'instant pas impacté la dynamique épidémique. Plus d'informations sont disponibles dans l'analyse de risque qui sera publiée ce jour sur [notre site](#).

La vaccination et l'application des gestes barrières restent recommandées

Au 13 février 2023, seuls **22,2% des 60-79 ans et 24,9% des 80 ans et plus avaient reçu un rappel adapté au variant Omicron** (26,8% et 28,5% respectivement parmi les éligibles)². Par ailleurs, 27,4% des 60-79 ans avaient reçu une injection datant de moins de 6 mois³ et 18,8% des 80 ans et plus une dose datant de moins de 3 mois⁴.

Dans ce contexte de lente progression, **la vaccination contre la COVID-19**, notamment par un rappel avec un vaccin bivalent (contre la souche initiale et le variant Omicron) chez les primo-vaccinés éligibles (dès 3 mois ou 6 mois après la dernière injection selon les recommandations en vigueur), **reste nécessaire**.

Alors que le SARS-CoV-2 et les virus hivernaux co-circulent sur le territoire, il est fortement recommandé aux **personnes à risque de développer une forme grave de la grippe** de recourir à la vaccination contre la grippe saisonnière (campagne prolongée jusqu'au 28 février 2023).

Les vaccinations contre la grippe et contre la COVID-19 peuvent être réalisées le même jour.

¹ Du fait d'une évolution possible du recours au dépistage, notamment en lien avec la modification du dispositif d'indemnisation dérogatoire des arrêts de travail à compter du 1er février 2023, ces indicateurs peuvent être sous-estimés et doivent être interprétés avec prudence

² Les personnes ayant reçu une dose de rappel adaptée aux variants Omicron sont les personnes avec une primo-vaccination complète qui ont reçu une dose de rappel avec un vaccin bivalent (Pfizer original/Omicron BA.5 ou Moderna original/Omicron BA.1), qu'ils aient précédemment reçu une dose de rappel, plusieurs ou aucune. Celle-ci est recommandée 3 mois après la dernière injection de vaccin pour les 80 ans et plus, et 6 mois pour les 60-79 ans et autres personnes à risque de formes graves de Covid-19. Afin de laisser le temps aux personnes éligibles de réaliser leur injection, l'éligibilité est mesurée avec un mois supplémentaire depuis la dernière injection (4 mois pour les 80 ans et plus et 7 mois pour les 60-79 ans).

³ Tous vaccins confondus.

⁴ Tous vaccins confondus.

L'adhésion aux gestes barrières et aux autres mesures préconisées reste recommandée, notamment en cas de symptômes ou de test positif, ainsi que pour protéger des personnes vulnérables.

Pour plus d'informations : [COVID-19 : point épidémiologique du 16 février 2023 \(santepubliquefrance.fr\)](#)

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez [le dossier Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#). Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#). Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#).

Contacts presse

Santé publique France - presse@santepubliquefrance.fr

Stéphanie Champion : 01 41 79 67 48 – Marie Delibéros : 01 41 79 69 61

Charlène Charbuy : 01 41 79 68 64 – Cynthia Bessarion : 01 71 80 15 66